



*Brachychiton discolor* F. Muell.

### Famille

MALVACEAE

### Synonymes

*Brachychiton luridus* C. Moore  
ex F. Muell

*Sterculia lurida* Benth (C.  
Moore ex F. Muell.) F. Muell. ex  
Benth.

### Nom commun

Brachychiton bicolore  
White Kurrajong  
Queensland Lacebark



### Propriétés

Ornementale faiblement rustique tolérant les sécheresses, pour jardins de climats doux et ensoleillés, sur sol riches, neutres à acides et drainant.

### Morphologie

Arbre massif atteignant 10 à 30 mètres dans son milieu naturel.

Tronc, à base plus ou moins renflée, à écorce verte quand elle est jeune puis devenant grise en vieillissant.

Feuilles, cordiformes ou palmatilobées vert foncé sur le dessus, à tomentum gris-brun à argentés en dessous, souvent caduques avant la période de floraison.

Fleurs apétales, au calice pétaloïde rouge-rose velouté-pelucheux, en forme de cloches de 5 centimètres de diamètre, groupées en épis se formant en bout de branche et s'épanouissant de la fin de printemps au début de l'automne.

Fruits multiples constitués de 2-5 follicules en formes de barques recouvertes d'un duvet roux et contenant des graines jaunes comestibles mais entourées de poils irritants.

### Situation géographique

Forêts pluviales des côtes de l'Australie orientale (Queensland et Nouvelles-Galles du Sud).

**Rédaction :** Marc Bottin

**Photographies :** Catherine Ducatillon et Marc Bottin

