

Archontophoenix cunninghamiana

(H. Wendl.) H. Wendl. & Drude

Noms communs : Palmiste de Cunningham, Palmier élégant d'Australie



Aire naturelle



Forêts claires subtropicales de la côte est d'Australie (Nouvelles Galles du Sud, Queensland), sur sol humide.

Période de floraison :



D'introduction récente, cette espèce fait partie des palmiers **les plus esthétiques** et **les moins fréquents** de la région Sud. Il n'a pas été atteint (pas encore ?) par les ravageurs principaux des palmiers : charançon rouge et papillon palmivore.

Largement cultivé en Australie et dans le Sud de la Californie pour ses **propriétés ornementales**, il est **faiblement rustique**, à réserver aux zones les plus protégées de la Riviera, sur **sol riche et bien arrosé**. La germination des graines ne pose pas de difficultés particulières.



Description

C'est un palmier très élégant à **couronne** relativement peu développée et à **stipe** lisse, parfois légèrement renflé à la base, annelé, de couleur gris clair. Les **feuilles pennées** sont grandes (jusqu'à 4,5 mètres de longueur), élégantes, d'un vert profond. La base du **pétiole** forme une longue et large gaine qui entoure complètement le stipe. Les feuilles se détachent seules, leur base laissant une fine cicatrice annelée sur le stipe.

La **floraison** de couleur rose mauve est spectaculaire. L'**inflorescence** apparaît à la base de la gaine foliaire qui s'entrouvre pour la laisser se développer. Elle porte des **fleurs mâles** et des **fleurs femelles** qui s'épanouissent de juin à Aout. Les **fruits** sont également décoratifs, en forme de petites billes écarlates, de 1 cm de diamètre. Attention, les fruits sont toxiques.