

Livistona australis

(R.Br.) Mart.

Noms communs : Palmier éventail, Cabbage Palm, Cabbage Tree



Aire naturelle



Ce palmier élégant pousse dans les zones humides des forêts ouvertes, marécageuses, ou sclérophylles humides, le long des berges des cours d'eau d'Australie (Queensland, Victoria, Nouvelles Galles du Sud), où il peut localement constituer de grandes colonies.

Introduit à la Villa Thuret en 1861, il est relativement méconnu dans le sud de la France, en dehors des collections et en dépit de **sa tolérance aux principaux ravageurs** (charançon rouge et papillon palmivore) et au climat. A Antibes, il a **résisté aux hivers exceptionnels** des années 1985-86 (- 8 à - 10 °C) **et à la sécheresse** récurrente. Mais il apprécie la chaleur et un arrosage estival. Ce palmier pourrait être utilisé en alignement urbain, en spécimen isolé ou en groupes.

Période de floraison



Description

C'est un palmier élégant pouvant atteindre **25 mètres de haut**. Le **stipe** mince, de couleur sombre, est fendillé longitudinalement et présente çà et là de petits bourrelets en anneau ; les bases des **pétioles** sont parfois pérennes et visibles à la base du stipe. Les **feuilles** en éventail, légèrement **costapalmées**, sont presque circulaires, d'un vert brillant, assez clair. Le **pétiole**, peu épineux, est beaucoup plus long que le limbe, dont les segments périphériques sont libres et pendants, ce qui donne à la couronne une physionomie ouverte et gracieuse. Les feuilles mortes tombent naturellement. La **floraison** est discrète et ne présente pas beaucoup d'intérêt. C'est une espèce à fonctionnalité dioïque, même si les 2 types de fleurs mâles et femelles se rencontrent sur le même spécimen.

